

# 高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種説明書

## 【接種対象者】

- ①接種時65歳
- ②接種時60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいや有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいや有する方（身体障害者手帳1級程度の方）

※既に肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある方は対象となりません。  
※栃木市に住所のある方が対象です。

## 【助成回数】 生涯1回

## 【助成金額】 5,700円

※医療機関の設定料金から5,700円をひいた差額分が自己負担額です。

※市内医療機関に事前に予約が必要です。

※何らかの理由で市外の医療機関で受ける場合には、事前に健康増進課（☎25-3512）までご連絡ください。

※生活保護世帯に属する方については、接種後に申請書を提出することにより自己負担額（8,000円まで）を助成いたします。

## 【肺炎球菌とは】

肺炎球菌は、成人肺炎となる原因の25～40%を占めており、中耳炎、副鼻腔炎、気管支炎、敗血症、髄膜炎等の原因にもなります。肺炎球菌ワクチンは、すべての肺炎を防ぐものではありませんが、接種をすることにより、肺炎球菌による肺炎の重症度と死亡のリスクを軽減させる効果が期待されています。

## 【ワクチンについて】

肺炎球菌感染症で頻度の高い23種類の莢膜型の肺炎球菌を型別に培養し、殺菌後に抽出、精製した莢膜ポリサッカライド（多糖体）を混合したワクチンです。

1回0.5mlを筋肉内又は皮下に注射します。健康な人では、少なくとも接種後5年間は効果が持続すると言われています。

## 【予防接種の副反応】

接種後に注射部位の膨脹や、疼痛、発熱（ときに高熱）がみられることがありますが、通常1～2日で消失します。筋肉痛、倦怠感、違和感、悪寒、頭痛がみられることもあります。稀に報告される重い副反応としては、アナフィラキシー様反応、血小板減少、ギランバレー症候群、蜂巣炎様反応等があります。

## 【予防接種を受けることが適当でない方】

- ・明らかに発熱（通常 37.5 ℃以上）している方
- ・重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
- ・ワクチンの成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある方
- ・その他、医師が不適当な状態と判断した方

## 【接種の判断を行うに際し、医師とよく相談しなくてはならない方】

- ・心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気などの基礎疾患のある方
- ・予防接種で接種後2日以内に発熱の見られた方及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を起こしたことがある方
- ・過去にけいれんの既往のある方
- ・過去に免疫不全の診断がなされている方及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
- ・ワクチンの成分に対してアレルギーを起こすおそれのある方

## 【接種後の注意】

- ・接種後 30分間 くらいは安静にしてください。
- ・接種当日は激しい運動をさけてください。入浴は差し支えありませんが、注射したところをこすらないでください。
- ・接種後1週間は副反応の出現にご注意ください。接種部位の異常や体調の変化、さらに高熱やけいれんなどの異常な症状があらわれた場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

## 【健康被害の救済】

予防接種法に基づく定期予防接種によってひき起された副反応により、医療機関で治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害が残ったりした時は、その予防接種と因果関係がある旨を厚生労働大臣が認定した場合、国の定める医療費・医療手当・障害年金等の給付を受けることができます。

### お問合せ先

保健福祉部 健康増進課 感染症対策係

TEL (0282) 25-3512

栃木市今泉町2-1-40（栃木保健福祉センター内）