水稲のカメムシ類防除はＲＡＣコードを参考に

同系統の薬剤の連用を避けましょう

2025年6月　栃木県農政部経営技術課

他県では、**イネカメムシに対して一部薬剤の効果が低下**する事例が報告されています。**必ず異なる系統の薬剤をローテーションで使用**して、薬剤抵抗性の発達を防ぎましょう。

表　水稲のカメムシ類に登録がある主要な薬剤（本田防除剤）

商品名	IRACコード：系統名
スミチオン乳剤	１Ｂ：有機リン系
キラップ粒剤 キラップフロアブル ブラシンキラップフロアブル ラブサイドキラップフロアブル ラブサイドK2フロアブル ダブルカットKフロアブル	２Ｂ： フェニルピラゾール系
トレボンEW トレボンエアー アミスタートレボンSE ダブルカットトレボンフロアブル	３Ａ： ピレスロイド系
ダントツ粒剤 ノンブラスバリダダントツフロアブル ラブサイドダントツフロアブル アミスターアクタラSC スタークル液剤10 スタークルメイト液剤10 トップジンスタークルフロアブル ビームエイトスタークルゾル	４Ａ： ネオニコチノイド系
エクシードフロアブル ビームエイトエクシードゾル ビームエイトEXゾル	４Ｃ： スルホキシイミン系

ローテーションの一例

１回目防除
２Ｂ
（キラップ粒剤等）
→
２回目防除
４Ａ
（スタークル液剤10等）
→
３回目防除
３Ａ
（トレボンＥＷ等）